

Comportamiento no provocado	Normal	0										
	Cambios menores	1										
	Movilidad reducida, asilado pero alerta	2										
	Automutilación, muy inquieto o inmóvil	3										
Respuestas de comportamiento a los estímulos externos	Normal	0										
	Depresión menor o exageración de la respuesta	1										
	Respuestas moderadamente anormales	2										
	Reacciones violentas o en estado de coma	3										
Signos clínicos	Frecuencia respiratoria normal	0										
	Cambios leves en el ritmo de la respiración	1										
	Aumento de la frecuencia respiratoria abdominal	2										
	Respiración abdominal marcada, cianosis	3										
* Total (0-18)												

* 0-4 = Notificar al veterinario; 5-9 = Monitorear cuidadosamente; 10-18 = Eutanasia

Criterios de punto final:

Adicional a la escala de punto final, los animales deben ser eutanasiados si:

- La pérdida de peso es mayor al 25%
- Inapetencia o deshidratación por mas de 48 horas.

- Piloerección, postura encorvada, pupilas dilatadas por más de tres días

Referencias:

- Lloyd M. H. & Wolfensohn S.E. Practical use of distress scoring systems in the application of human endpoints. Pag. 48-53
- Laboratory animals. Guía para el punto final humanitario en la experimentación animal para la investigación biomédica: aspectos éticos, legales y prácticos. 2005, 8; 5-12 (http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-sheticct/es/contenidos/informacion/vri_ceba/es_vri_etico/adjuntos/Guiadepuntofinal.pdf)
- IACUC Guideline Humane Intervention and Endpoints for Laboratory Animal Species, (<http://www.upenn.edu/regulatoryaffairs/Documents/iacuc/guidelines/iacucguideline-humaneendpoints-8%2023%2011.pdf>)
- Institutional Animal Care and Use Committee Guidebook, (<http://grants.nih.gov/grants/olaw/guidebook.pdf>)
- Canadian Council on Animal Care. Guidelines on: choosing an appropriate endpoint in experiments using animals for research, teaching and testing. 1998. (http://www.ccac.ca/Documents/Standards/Guidelines/Appropriate_endpoint.pdf)